

てん菜の病害虫防除について

JA今金 農業経営課
北海道糖業(株) 道南製糖所 原料課

病害虫発生予察情報(6月報)によるとヨトウガ発生期:早、発生量:やや少となっております。
本地区においても幼虫の発生が確認されております。これから気温・湿度が上がると病害虫の多発が予想されますので圃場をよく観察し、下記の要領で防除を実施して下さい。

※農薬の使用に当たっては農薬取締法を遵守してください。また散布前には必ずスプレーヤー等を洗浄してください。

防除時期目安:6/20~25日

防除方法(10a 当り)

薬 剤 名		薬量(倍率)	対象病害虫	水量	使用回数
リンバー顆粒水和剤		4,000 倍	根腐病	100 リットル	3 回
ど ち ら か	ゲットアウトWDG	3,000 倍	ヨトウムシ		4 回
	バイスロイド乳剤	2,000 倍	カメノコハムシ		4 回

1. 根腐病防除について

根腐病防除は地上2回散布が極めて効果的です、次回(7月上旬)も必ず実施して下さい。

2. 雑草対策

雑草が大きくなる前に除草剤を散布しましょう。

生育が旺盛な圃場につきましては、北糖式根際散布が効果的です。

深耕カルチなど、排水対策・地温の上昇に努めましょう。

生育を回復させるため、スーパーハイケルプを混用してください。
(遅く定植した方や生育が遅れている方は、10a 当り 200ml (500 倍) が効果的です)

**<重要> 作付調査表を JA 担当部署まで提出されますよう
お願い致します。**

新担当になりました、北海道糖業の藤井です。

6/10に着任しました。

皆様と一緒にてん菜の増収に取り組んでいき
たいと思いますので、これからよろしくお願
いいたします!

出身:兵庫県西宮市

