



馬鈴しょNo.2

のう　　じ　　でん　　そう
農　時　電　送

JAきたひやま・JA新はこだて若松基幹支店・JA今金町
檜山農業改良普及センター檜山北部支所　TEL 84-5514

馬鈴しょの疫病発生に注意してください！

北海道病害虫防除所で発表しているFLABS（疫病発生予測）の、疫病感染好感度指数は6月16日現在で23となり危険期到達日に達しました【今金町（露地作型、今年の萌芽期は5月29日）】。

このため、70%信頼区は6月23日～7月14日となります。疫病の初発は7月4日頃と予測されています。ほ場観察に努め、予防防除を徹底してください。

※ FLABS は気象データのうち「最高気温」「最低気温」「平均気温」「降水量」の4要素を用いて馬鈴しょ疫病の「感染好適指数」を算出し、初発日を予測するシステムです。萌芽日からの累積値が「2.1」に達した日を危険期到達日として「初発日」を予測します。

《疫病》

- ・ 薬剤については、馬鈴しょN01を参考にしてください。
- ・ 疫病の発生がみられた場合、防除間隔を短縮し、治療効果のある薬剤を使用してください。
- ・ 耐性菌の発生を防ぐため、同一成分の薬剤による防除を避けましょう。

《アブラムシ》

- ・ 薬剤については、馬鈴しょN01を参考にしてください。
- ・ 発生時期やアブラムシの種類に応じて薬剤を選択しましょう。
- ・ 特に種子馬鈴しょほ場は、周辺雑草（クローバ、ヨモギ等）の除草に努めてください。

○**土壌病害の拡散防止！機械・長靴の洗浄励行！**○

○**水分補給で、熱中症を防ぎましょう！**○