



春小麦 No.2

のう じ でん そう

農 時 電 送

J A新はこだて若松支店、J Aきたひやま、J A今金町
 檜山農業改良普及センター檜山北部支所 TEL 84-5514


春まき小麦 赤かび病防除 1回目は適期に！

春まき小麦の生育は早いほ場で止葉期に達しています。赤かび病も秋まき小麦同様予防のための防除を必ず行ってください。

防除は、ほ場観察を行い、秋まき小麦と同様のタイミングで行ってください。

☆赤かび病防除のポイント

防除適期は「開花始め」。
 降雨が予想される場合には
穂が出そろった時期に早めに防除
を行いきましょう。
 ※「葉焼け」を防ぐため、夕方の涼
しくなった時間帯に行いましょう。



ニューカントリーより一部改変

☆赤かび病の防除体系例

防除時期	薬 剤 名	使用倍率	使用時期	回数
開花始め	バラライカ水和剤	500	収穫14日前	2
	または リベロ水和剤	2,000	収穫7日前	3
1回目の 7日後	ベフトップジンフロアブル	800~ 1000	収穫14日前	出穂期以降 1
2回目の 7日後	リベロ水和剤	2,000	収穫7日前	3
	または シルバキュアフロアブル	2,000	収穫7日前	2

※ バラライカ水和剤はシルバキュアフロアブル（テフコナゾール）とオーソサイド（キャプタン）の混合剤です。総使用回数はバラライカ水和剤とシルバキュアフロアブルを合わせて2回以内なので注意してください。

○●心に余裕を持って農作業を行いきましょう！●○