

のう　　じ　　でん　　そう

農時電送

水稻 No.臨時

JA新函館・若松支店

JAきたひやま

JAいまかね

檜山農業改良普及センター

せたな地区水稻部会・北檜山町農協地区水稻部会・今金町稲作部会

檜山北部支所 (84-5514)

葉いもち感染好適日 (BLASTAM) 情報 今金町 7月1-2日：●点灯！

北海道病害虫防除所の葉いもち感染好適日 (BLASTAM) 情報によると、全道各地のアメダス地点で 好適条件：●が点灯していますので、今後の対応など十分注意して下さい。

- 1 葉いもち感染発生予測「BLASTAM」(ブラスタム)
北海道病害虫防除所 <http://www.agri.hro.or.jp/boujosyo/>

感染した場合●点灯から7～10日後頃には初発を確認できるようになりますので、ご注意下さい。

* 好適条件 *

降雨が4 (mm/1時間) 以下
風速3m以下
日照がない
気温が15～25℃

* 発生しやすい場所 *

- ・過去にいもち病が発生したほ場
- ・風当たりの弱いほ場 (沢地や建物の陰など)
- ・葉色が濃く茂っている (窒素の施肥量が多い場所) ほ場

2 見回り方法

- ・水田1筆につき10m×4か所、下葉に注意して見歩く
病斑がひとつでもあれば、速やかに茎葉散布剤を使用

3 大雨に伴う対応

7月8日の大雨により浸水・冠水したほ場が見られます。過湿によって病害が発生する恐れがあるため、薬剤防除を実施しましょう。

適期の予察・防除で病害虫被害を抑止！