

病害虫防除について

JA今金 農業経営課
北海道糖業(株) 原料課

7/29 発信の北海道病害虫防除所 8 月予報では褐斑病の発生期：既発(並)、発生量：並となっております。ここ数日は高温・多湿の気象が続いておりますので、今後の防除においては薬剤散布間隔の順守が重要となります。各種収穫作業が始まりご多忙中と存じますが、気象情報に注意しながら圃場をよく観察し、良質なビートの生産に努めましょう。

1. 第3回褐斑病及び害虫防除について

根腐病の発生が一部の圃場で見られております。

発病が見られる場合には褐斑病と害虫防除に併せて、モカットフロアブル 40【1,000 倍：100ml】もしくはモセリン顆粒水和剤 【1,000 倍：100g】の混用で同時防除が可能です。

皆様圃場を予察された上で状況に併せて下記の要領で防除を実施して下さい。

防除時期：8月10日～15日

対象	薬剤	希釈倍率	薬量	使用回数	水量
褐斑病	グリーンガード or グリーンガード	500 倍	200g	5 回	100ℓ
ヨウ・加刀・ヨウ	マッチ乳剤	3,000 倍	33ml	2 回	
生育促進	スーパーハイケルプ	600 倍	170ml	-	

注2) 農薬の使用にあたって農薬取締法を遵守してください。また散布前には必ずスプレーヤー等を洗浄してください。

2. 排水対策について

今後も大雨・台風に備えて、暗渠及び明渠の排水溝の点検・清掃を実施して下さい。

3. 次年度畑の準備について(次年度てん菜予定地 等)

- (1) コスト低減の意味からも土壌診断を活用し、適正施肥に向けての準備を行いましょう。
- (2) 圃場の pH を測定し、適正量の石灰を投入して下さい。(直播予定の方は必ず実施!)

酸度矯正には安価なホクトウライムエースがお勧めです。

今回は 8 月 25～30 日に

褐斑病 : カスミンボルドー (800 倍)

葉腐病 : モカットフロアブル 40 (1,000 倍) もしくは、モセリン顆粒水和剤 (1,000 倍)

殺虫剤 : カウンター乳剤 (3,000 倍) の予定です。