

のう じ でん そう

農時電送

R2 水稲 No.⑥

JA新函館・若松支店

JAきたひやま

JAいまかね

檜山農業改良普及センター

せたな地区水稲部会

・北檜山町農協地区水稲部会

・今金町稲作部会

檜山北部支所 (84-5514)

注意！高温多湿！！ 病害虫防除の実施を！

1 北檜山作況調査ほ場の出穂期

	せたな町	今金町
出穂期 (ななつぼし)	7月29日	7月30日

2 せたな町予察結果 (8/3～4実施)

富里	1頭	栄石	4頭
二股	13頭	栄	28頭
上若松	37頭	共和	3頭
濁川	22頭	大里	0頭

一部の地区で発生頭数が
多くなっています！

多くのほ場に出穂を迎えており、出穂期は平年より2日早くなっています。
いもち病とカメムシ類の防除を効果的に行いましょう。

<p>効率・効果的防除 ⇒ <u>出穂期後7～10日の防除を徹底する。</u> ※各JA防除ガイドを参考に農薬選定し、使用基準を遵守すること。</p>

3 病害虫の予察と防除対策

(1) カメムシ類 (アカヒゲホソミドリカスミカメ)

予 察 ⇒ ①補虫網 (20回振り) ②フェロモントラップ

要防除水準

(基準は共通)

⇒

品 種	捕虫数
きたくりん	3頭以上
ななつぼし、ゆめぴりか等	2頭以上

(2) いもち病

* 高温多湿・風の弱い日が続くと発生が懸念されるため、防除を実施しましょう。
特に、今年は葉色が濃く発生リスクが高まっています！

予 察 ⇒ BLASTAM情報 (発生しやすい気象条件で特に注意！)

要防除水準 ⇒ 発生が見られたら直ちに防除の実施！

ほ場の見回りと早期発見・適切な対応を！