

## てん菜病害虫防除《号外》について

JA今金 農業経営課  
北海道糖業(株)原料課

札幌管区気象台の1か月予報では平均気温が平年より高くなる見込みであり、病害の発生リスクは依然として高いままとなっております。

このため、

現在病害の発生している圃場では追加防除の検討をお願いいたします。

防除時期：9月25日～30日

(10a当り)

対象	薬剤名		希釈倍率	薬量	回数	水量	収穫前日数
褐斑病	どちらか	グリーンダイセン グリーンペンコゼブ	500倍	200g	5回	100ℓ	21日前

注1)防除に当たっては「てん菜栽培ガイド」P13～16もご確認ください。

注2)農薬の使用にあたって農薬取締法を遵守してください。また散布前には必ずスプレーヤー等を洗浄してください。

## 【収穫前防除の注意点】

☆各薬剤に於いて使用時期（収穫前〇〇日前など）や総使用回数が設定されていますので、使用基準を遵守願います。遵守されない場合は、その原料を買入出来ませんので十分ご注意ください。

※農薬の使用基準を確認のうえ正しく使用して下さい。（主な農薬の使用基準は下記の通り）

薬剤名	収穫前日数	使用回数	薬剤名	収穫前日数	使用回数
プランダム乳剤	7日	3回	ハイスロイド乳剤	14日	4回
ホクガード乳剤	14日	2回	ゲットアウトWDG	14日	4回
デビュー乳剤	14日	4回	ベジホン乳剤	21日	4回
グリーンダイセンM水和剤	21日	5回	テルスター水和剤	7日	4回
モンカットフロアブル40	14日	4回	マッチ乳剤	14日	2回
モンセレン顆粒水和剤	30日	4回	カスケード乳剤	7日	4回
カスミンボルドー	7日	5回	カウンター乳剤	7日	2回