

てん菜病害虫防除《最終》について

JA今金 農業経営課
北海道糖業(株)原料課

渡島・桧山地区 8/20 時点の登熟調査結果については7ヶ年平均対比で根重：109%、莖葉重：141%、根中糖分：96%となっており、良好に推移しております。本年は褐斑病・根腐病などの発生が散見されておりますので、病害の多発に繋がらないように最後まで防除の徹底をお願いいたします。

最終防除としておりますが、病害虫の発生状況によっては追加防除も検討しております。

防除時期：9月10日～15日

(10a当り)

対象	薬剤名	希釈倍率	薬量	回数	水量	収穫前日数
褐斑病	グリーンダイセン	500倍	200g	5回	100ℓ	21日前
	or グリーンペンコセブ					
ヨウムシ シロオビノメイガ	カスケード乳剤	4,000倍	25ml	4回		7日前

注1)防除に当たっては「てん菜栽培ガイド」P13～16もご確認ください。

注2)農薬の使用にあたって農薬取締法を遵守してください。また散布前には必ずスプレイヤー等を洗浄してください。

【収穫前防除の注意点】

- ☆今回が収穫前の最終防除の予定ですが、今後の気象経過、病害虫の発生状況によっては、追加防除が必要になるかもしれません。
- ☆各薬剤に於いて使用時期（収穫前〇〇日前など）や総使用回数が設定されていますので、使用基準を遵守願います。遵守されない場合は、その原料を買入出来ませんので十分ご注意ください。

※農薬の使用基準を確認のうえ正しく使用して下さい。(主な農薬の使用基準は下記の通り)

薬剤名	収穫前日数	使用回数	薬剤名	収穫前日数	使用回数
プランダム乳剤	7日	3回	ハイスロイト乳剤	14日	4回
ホクガード乳剤	14日	2回	ゲットアウトWDG	14日	4回
デビュー乳剤	14日	4回	ベジホン乳剤	21日	4回
グリーンダイセンM水和剤	21日	5回	テルスター水和剤	7日	4回
モンカットフロアブル40	14日	4回	マッチ乳剤	14日	2回
モンセレン顆粒水和剤	30日	4回	カスケード乳剤	7日	4回
カスミンボルドー	7日	5回	カウンター乳剤	7日	2回

追加防除をする場合は、9月中下旬に防除広報を検討しております。
【褐斑病：DMI・マンゼブ混合剤いずれか】【シロオビ：IGR剤いずれか】