

てん菜の病害虫防除について

JA今金 農業経営課
北海道糖業(株) 道南製糖所 原料課

病害虫発生予察情報（6月予報）によるとヨトウガ発生期：やや早、発生量：並となっております。また根腐病については既に発生が確認されている圃場もあります。これから気温・湿度が上がると病害虫の発生が予想されますので圃場をよく観察し、下記の要領で防除を実施して下さい。

防除時期：6月20日～30日

(10a当り)

対象	薬剤名		希釈倍率	薬量	使用回数	水量
根腐病	どちらか	ミリオネアフロアブル	4,000倍	25ml	4回	100ℓ
		リンパー顆粒水和剤	4,000倍	25g	3回	
ヨトウムシ カメノコハムシ	どちらか	ゲットアウトWDG	3,000倍	33g	4回	
		バイスロイド乳剤	2,000倍	50ml	4回	

注1)防除に当たっては「てん菜栽培ガイド」P13～16もご確認ください。

注2)農業の使用にあたって農業取締法を遵守してください。また散布前には必ずスプレー等を洗浄してください。

1. 根腐病防除について

根腐病防除は地上2回散布が極めて効果的です、次回（7月上旬）も必ず実施して下さい。

「ライエン」・「カーベ2K314」作付圃場でカルチ・培土を施工する場合は根際に土が寄らないよう注意してください。

2. 雑草対策

雑草が大きくなる前に除草剤を散布しましょう。

生育が旺盛な圃場につきましては、北糖式根際散布が効果的です。

深耕カルチなど、排水対策・地温の上昇に努めましょう。

生育を回復させるため、スーパーハイケルプを混用してください。
(遅く定植した方や生育が遅れている方は、
10a当り200ml(500倍)が効果的です)

<重要> 作付調査表をJA担当部署まで提出されますようお願いいたします。