

# 病害虫防除について

JA今金 農業経営課  
北海道糖業(株)原料課

8月20日時点におけるてん菜生育状況は、過去7カ年平均と比較して、根重が91%、根中糖分は116%でした。

収穫時期を迎え大変お忙しい中かと存じますが、高温傾向が続いており褐斑病・葉腐病・害虫の発生も見られておりますので、適期防除を実施し病害虫の発生を防ぎましょう。

## 1. 病害虫防除について

防除時期：8月25日～30日

(10a当り)

対象	薬剤	希釈倍率	薬量	使用回数	水量
褐斑病	カスミンボルドー	800倍	125g	5回	100ℓ
葉腐病	モンカットフロアブル40	1,000倍	100ml	4回	
	または モンセレン顆粒水和剤	1,000倍	100g	4回	
ヨトウムシ・カメノコハムシ シロオビ	カウンター乳剤	3,000倍	33ml	2回	
生育促進	スーパーハイケルプ	600倍	170ml	-	

注1)防除に当たっては「てん菜栽培ガイド」P13～16もご確認ください。

注2)農薬の使用にあたって農薬取締法を遵守してください。また散布前には必ずスプレーヤー等を洗浄してください。

次回(最終防除予定)は、9/10～15です。

褐斑病：マンゼブ水和剤(500倍)

ヨトウムシ・カメノコハムシ・シロオビノメイガ：カスケード乳剤(4,000倍)の予定です。