

種子大豆 No.1

のう
農時電送

JA今金町
檜山農業改良普及センター檜山北部支所 TEL 84-5514

種子大豆のは種について

★は種の目安

は種時期は5月中旬以降（地温10°C以上、出芽期に降霜の心配がない時期）を基本とし、5月中には種作業を終わらせましょう。

施肥例：S325またはBBS343 50～70kg/10a (窒素:1.5～2.1kg/10a)
※施肥量は地力により調整する。また、窒素過多は根粒菌の着生を悪くするので避ける。

★は種前に使用する農薬

対象病害虫	薬剤名	施用方法	施用量	回数
苗立枯病、紫斑病、タネバエ、ハト	キヒゲンR-2フロアブル	塗沫処理	乾燥種子1kg当たり 原液20mL	1回
タネバエ、苗立枯病、斑点細菌病	粉衣用ペアーカスミンD	種子粉衣	乾燥種子重量の 0.3～0.5%	1回
タネバエ、アブラムシ類 ネキリムシ類	クルーザーFS30	塗沫処理	乾燥種子1kg当たり 原液6mL	1回
リゾクトニア根腐病、 苗立枯病、紫斑病、茎疫病、タネバエ、アブラムシ類、	クルーザーMAXX	塗沫処理	乾燥種子1kg当たり 原液8mL	1回

※クルーザーと種子粉衣剤を併用する場合は、クルーザー→粉衣剤→根粒菌の順で処理すること。

※タネバエの多発が懸念される場合は、ダイアジノン粒剤5を播溝施用しましょう。

※紫斑病の発生が確認されているほ場では、キヒゲンR-2フロアブルもしくはクルーザーMAXXを施用しましょう。


★除草剤散布

豆類の除草剤は、使用時期が細かく決められています。

下の図を参考に、各薬剤の使用基準を守って散布しましょう。

除草剤の使用時期の表現

《菜豆・大豆》



ニューカントリー2010年5月号より

★参考：種子生産場審査の基準★

(1) 前作に種子生産が行われる作物と同じ作物が栽培されていた場合には、前作の収穫後1年以上経過していなければならない。

=連作は駄目。生産物は種子として認められません。

(2) 隣接する同一作物との間は、用排水路、畦畔、裸地等によって区分され、十分な距離が確保されていなければならない。

=倒伏の発生時や収穫時の混入を避けるため、ロータリーハード程度の距離を確保（雑草処理も可能にする）。

○●農薬の適正使用・飛散防止に努めましょう●○