

小豆 No.1

農時電送（のうじでんそう）

ＪＡ新はこだて若松支店、ＪＡきたひやま、ＪＡ今金町
檜山農業改良普及センター檜山北部支所　TEL 84-5514

小豆のは種について

☆は種のポイント

「適期は種の励行と、は種深度３cm程度を確保！！」

・土壌水分が多い時は、は種を避けましょう。
・気温（地温10℃以上）が上がる、好天の日には種しましょう。
・深植えは、地温が確保できません。覆土が３cm程度になるようには種機を調整しましょう。

※安定した収量・品質を確保するため、は種時期は６月上旬まで。
秋の初霜を考慮すると、は種晩限は６月10日頃です。

☆品種別は種時期

品　種	は種時期	株間と10a当たり株数	
		18cm	21cm
エリモ１６７	5月下旬～6月上旬	8,418株	7,215株
しゅまり			
アカネダイナゴン			
とよみ大納言	6月上旬		

※10a当たり株数：うね幅66cmで計算

＊年によって種子の大きさ（百粒重）が異なります。は種板の穴の大きさを確認しましょう。

☆施肥例：Ｓ６４４またはＢＢＳ６４３　50～60kg/10a

※地力で施肥量を増減する。窒素過多は根粒菌の着生を悪くするので避けましょう。
※初期生育が劣るほ場では、リン酸資材を増肥します（例：ダブリン20kg/10a程度）。

☆は種時に使用する農薬例

対象病害虫	薬　剤　名	使用方法	使　用　量
タネバエ、苗立枯 褐斑細菌病	粉衣用ペアーカスミンＤ	種子粉衣	種子重量の0.3%
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 タネバエ	クルーザーＦＳ３０	塗沫処理	乾燥種子1kgあたり原液６ｍｌ
茎疫病 タネバエ アブラムシ類	クルーザーMAXX	塗沫処理	乾燥種子1kgあたり原液８ｍｌ

※根粒菌は、種子消毒後に粉衣する。

☆除草剤散布

豆類の除草剤は、使用時期が細かく決められています。
右の図を参考に、各薬剤の使用基準を守って散布しましょう。



ニューカントリー2010年5月号より

○●農薬の適正使用・飛散防止に努めましょう●○