

■ミニトマト・トマトの殺菌剤

区分		毒性	予防/治療	系統名	薬 剤 名	希釈倍率	水100ℓあたり 使用薬量	使用時期 (収穫前日数)	回数 以内	適用病害虫名							防除上の注意事項
										すす かび 病	葉 か び 病	灰 色 か び 病	う ど ん こ 病	疫 病	輪 紋 病	菌 核 病	
散布	葉かび病 5月中旬 ～8月下旬	－	予治	SDHI	アフエットフロアブル	2000～4000倍	25～50ml	前日	3	2000●	2000●	2000●	●			2000●	・ミニトマトで斑点病に2,000倍登録あり。
		－	予治	SDHI	カンタスドライフロアブル	1000～1500倍	66～100g	前日	3		●	●				●	
		－	予治	SDHI	パレード 20 フロアブル	2000～4000倍	25～50ml	前日	3	2,000●	●	●	●			●	
		－	予治	ペンシイミダゾール ・N-フェニルカーバ メート	ゲ ッ タ ー 水 和 剤	ミニトマト:1500倍 トマト:1000～1500倍	ミニトマト:66g トマト:66～100g	前日	ミニトマト:3 トマト:5		●	●				●	
		－	予	アニリルピリミジン	フルピカフロアブル	2000～3000倍	33～50ml	前日	4			●					
		－	予治	DMI	トリフミン水和剤	3000～5000倍	20～33g	前日	5	3000●	●		3000●				
		－	予	微生物	インプレッションクリア	1000倍	100g	発病前～ 発病初期まで	－	●	●						
	灰色かび病 6月中旬 ～8月下旬	－	予治	フェニルアセトアミド・ DMI	パンチョTF顆粒水和剤	2000倍	50g	前日	2				●				
		－	予	グアニジン	ベルコートフロアブル	ミニトマト:4000倍 トマト:2000～4000倍	ミニトマト:25ml トマト:25～50ml	前日	2	●	●	●	●				・ミニトマトで斑点病に4,000倍登録あり。
	うどんこ病 6月中旬 ～8月下旬	－	予	グアニジン	ベルコート水和剤	ミニトマト:6000倍 トマト:3000～6000倍	ミニトマト:16g トマト:33～66g	前日	2		●	●					
		－	予治	QoI	ファンタジスタ顆粒水和剤	2000～3000倍	33～50g	前日	3	●	●	●				●	・斑点病にも登録あり。
		－	予	有機塩素	ダコニール 1000	1000倍	100ml	前日	ミニトマト:2 トマト:4	●	●	●	●	●	●		・炭疽病、斑点病、褐色輪紋病にも登録あり。
		－	予	シアノイミダゾール	ランマンフロアブル	1000～2000倍	50～100ml	前日	4					●			
		－	予治	CAA・有機塩素	プロポーズ顆粒水和剤	ミニトマト:1500倍 トマト1000～1500倍	ミニトマト:66g トマト:66～100g	前日	2		トマト 1000●			●			
		－	予	銅	クプロシールド	1000～2000倍	50～100ml	－	－	1,000●	1,000●			●			・かいよう病に1,000倍で登録あり。