

■ばれいしょの殺菌剤(植え付けまで)

| 区分 | 毒性 | 予防/治療 | 系統名 | 薬 剤 名 | 希釈倍率 | 水100ℓあたり 使用薬量 | 使用時期 (収穫前日数) | 回数 以内 | 適用病害虫 | | | | | | 防除上の注意事項 | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|----------|--------------|--------------|------|--------|-----|----|----------|--|--|
| | | | | | | | | | 黒あざ病 | 黒あし病 | そうか病 | 粉状そうか病 | 軟腐病 | 疫病 | | | |
| 種芋 切断刀の 消毒 | - | - | | ケ ミ ク ロ ン G | 10倍 | 10ℓ当たり 1kg | 種いも切断時 | - | | | | | | | | ・液の調合は必ず屋外で行うこと。作業中は必ずマスク、ゴム手袋を着用すること。 ・5秒間浸漬する。(切断刀の消毒) | |
| | - | - | | マ レ ク イ ッ ク A | - | 10ℓ当たり 500g | 種いも切断時 | 1 | | ● | | | | | | ・ケミクロンGと混合しないこと。 ・残液処理の際、薬液に中和液を投入しないこと。 (急激な発泡により容器から液が漏れる場合がある) | |
| 種芋 消毒 | - | 予治 | 抗生物質 | バ リ ダ シ ン 粉 剤 DL | 種芋重量 の0.3% (種芋粉衣) | 10kg当たり 30g | 植付前 | 1 | ● | | | | | | | ・切断した種いもは切断面が乾いてから処理する。 | |
| | - | 予治 | 抗生物質・ MBC | ア タ ッ キ ン 水 和 剤 | 40~60倍 (浸漬) | 1,666~ 2,500g | 植付前 | 1 | 40 倍 ● | 40 倍 ● | ● | | | | | ・種いも200kgに40倍液5~6ℓ散布するか 5~10秒間浸漬する。 ・萌芽後の種いも切断後の処理は薬害を生ずるので、必ず萌芽前に種いもを切断せずに処理する。 | |
| | - | 予治 | 抗生物質・ 抗生物質・ 銅 | バ ク テ サ イ ド 水 和 剤 | 50~100倍 (浸漬) | 1,000~ 2,000g | 植付前 | 1 | | ● | ● | | | | | ・種いも瞬間浸漬 | |
| | 劇 | 予治 | SDHI | ミ リ オ ネ ア フ ロ ア ブ ル | 400倍 (浸漬) | - | 植付前 | 1 | ● | | | | | | | ・種いも瞬間浸漬 | |
| | - | 予治 | 抗生物質 | ア グ レ プ ト 液 剤 | 100倍 (浸漬) | 1,000ml | 植付前 | 1 | | ● | ● | | | | | ・5~10秒間種いも浸漬 ・萌芽後や種いも切断後の処理は薬害を生ずるので、必ず萌芽前に種いもを切断せずに処理する。 | |
| | - | 予治 | 抗生物質 | バ リ ダ シ ン 液 剤 5 | 200倍 (浸漬) | 500ml | 貯蔵前 又は植付前 | 1 | ● | | | | | | | ・瞬時~10分間種いも浸漬 | |
| | 劇 | 予 | ベンゼンスルホンアミド | ス キ ャ ブ ロ ッ ク S C | 50倍 (浸漬) | - | 植付前 | 1 | | | ● | | | | | ・瞬間浸漬 | |
| | - | 予 | ジニトロアニリン | フ ロ ン サ イ ド S C | 100倍 (浸漬) | - | 植付前 | 1 | | | ● | | | | | | |
| | 全面 散布後 土壌 混和 | 劇 | 予 | ベンゼンスルホンアミド | ス キ ャ ブ ロ ッ ク S C | - | 3L | 植付前 | 2 | | | | ● | | | | |
| | | - | 予 | ジニトロアニリン | フ ロ ン サ イ ド S C | - | 600ml | 植付前 | 1 | | | | ● | | | | |
| - | | 予 | Qil | オ ラ ク ル 顆 粒 水 和 剤 | - | 250g | 植付前 | 1 | | | | ● | | | | | |
| 全面土 壌混 和・作 条土 壌混 和 | - | 予 | ベンゼンスルホンアミド | ネ ビ ジ ン 粉 剤 | 作条土壌混和:30kg/10a 全面土壌混和:60kg/10a | | 植付時 | 1 | | | ● | ● | | | | ・砕土をよく行った後、薬剤を均一に散布し土壌と充分混和する(深さ10~15cm)こと。 ・土壌の水分が高い場合は、使用を避ける。目に対して刺激があるので注意する。 | |