

■水稲 速度連動式地上液剤少量散布(パンクル)用の殺虫剤・殺菌剤

水田自走式ブームスプレーヤー等

区 分	毒 性	予 防 / 治 療	系 統 名	薬 剤 名	希 釈 倍 率	水25ℓあたり 使用薬量	使用時期 (収穫前日 数)	回 数 以 内	適 用 病 害 虫 名										防 除 上 の 注 意 事 項	
									い も ち 病	紋 枯 病	カ メ ム シ 類	ウ ン カ 類	ソ イ ウ ネ ム シ ズ	オ イ ネ ム ド シ ロ	ハ イ モ グ リ ヒ バ エ メ	ニ カ メ イ ガ	コ フ ヤ オ ガ ビ			
いもち病・ 紋枯病・ カメムシ 混合剤	—	予治	QoI ピレスロイド*	アミスタートレボン SE	300倍	83ml	14日前まで	3	●	●	●	●								・紋枯病の病斑が上位葉しようまでに及ぶような水田では出穂期頃に散布する
				カメムシ 混合剤	発生時 (臨機対応)	—	予治	抗生物質・ MBI-R・ ピレスロイド*	ダブルカットレボンフロアブル	300倍	83ml	穂揃期まで	2	●		●	●			
				MBI-R・ ネオニコチノイド*	ビームエイトスタークルゾル	250~300倍	83~100ml	7日前まで	3	●		●	●							
紋 枯 病				抗生物質	バリダシン液剤5	300倍	83ml	14日前まで	5		●									・病斑が上位葉しようまでに及ぶような水田では出穂期頃に散布する
カ メ ム シ	—	—	ピレスロイド*	トレボン乳剤	300倍	41~83ml	14日前まで	3					●	●						・カメムシ類の生息する畦畔等も防除する
					300~600倍						●									
					600倍						●									
				フェニルピラゾール	キラップフロアブル	500倍	50ml	14日前まで	2			●	●		●					・カメムシ類の防除は、出穂期と7日後の2回を基幹として行い、3回目以降については、発生動向に応じて実施する ・スタークル液剤10 1,000倍液またはキラップフロアブル1,000~2,000倍液またはエクシードフロアブル2,000倍液を使用する場合、基幹防除を出穂7~10日後の1回散布に省略できる。
				ネオニコチノイド*	スタークル液剤10	300倍	83ml	7日前まで	3			●	●							