【小麦病害虫防除体系例】

時期	5月 下旬	6月 上旬
生育 ステージ	止葉期始め	開花始め
赤さび病 赤かび病	ミリオネアFL (SDHI) 4000倍	バラライカ水和剤 (DMI+オーソサイド) または プロラインFL (DMI) 2000倍
	赤さび病	赤かび病①

【参考】 主要薬剤系統と道ガイド掲載状況

系統名	薬剤名	赤かび病	赤かび病 DON低減	ニバーレ
DMI+他	バラライカ水和剤	●	●	●
DMI	シルバキュアFL	●	●	
	リベロ水和剤	●	●	
	チルト乳剤	●		
	プロラインFL	●	●	●
SDHI	ミラビスFL	●	●	●
	ミリオネアFL			
MBC+他	プライア水和剤	●	●	●
MBC	トップジンM水和剤	●	●	
他	オーソサイド80	●		●
QoI	アミスター20FL			

6月 中旬	6月 下旬	7月 上旬
開花+7日	開花+14日	

ミラビスFL
(SDHI)
1500倍

シルバキュアFL
(DMI)
2000倍
または、リベロ水和剤
(DMI) 2000倍
または、チルト乳剤
(DMI) 1000~2000倍

赤かび病②

赤かび病③

葉枯症	赤さび病	うどんこ病	黒変病 /黒点病
○	●	●	○/-
	●	●	○/○
	●	●	○/○
○	●	●	○/-
	●	●	○/○
○	○		
	●	○	
○			
		○	
○			○/○
	●	●	