

区	毒	系 統 名	薬 剤 名	育苗箱 1箱あたり 使用量	使用時期	回数 以内	効 果 イ メ ー ジ				適 合 ロール目安			適 用 病 害 虫 名									防除上の注意事項		
							イネド ロオイムシ	ウンカ（縞葉枯病）	いもち病	紋枯病（疑似紋枯病）	【記号の意味】：成苗ポット1枚当りの施薬量について ○：調整により30g散布可（適合） △：調整により25g程度なら散布可 ×：調整しても25g未満の散布量 ■：調整しても30gを超える散布量 －：十分な知見なし ※投票はあくまで目安であり、機械の個体差や消耗度合いにより施用量のフレが生じる場合あり。			イネミズゾウムシ	イネドロオイムシ	イネヒメハモグリバエ	ニカメイチュウ	フタオビコヤガ	コブノメイガ	ツマグロヨコバイ	ウンカ類	いもち病		紋枯病	
											B ロール	A ロール	D ロール												
分	性	—	ジアミド	中苗マット 1箱当り50g	<u>は種前、 は種時覆土前 ～移植当日</u>	1	◎				○	○	○	●	●	※1	●	●	●	※1					※1：「移植当日」での登録
				成苗ポット 1箱当り30g																					
殺虫剤	—	ジアミド	パディート箱粒剤	中苗マット 1箱当り50g	<u>は種前、 は種時覆土前 ～移植当日</u>	1	◎	△			○	○	－	●	●	※1	●	●	●	●	※2				※1：「移植当日」での登録 ※2：「移植3日前～移植当日」でヒメヒウカに登録あり
				成苗ポット 1箱当り30g																					
殺虫・殺菌混合剤	—	チアジソールカルボキシミド・ジアミド	アプライフェルテラ粒剤	中苗マット 1箱当り50g	<u>は種前、 は種時覆土前</u>	1	◎		○		△	○	○	●	●	●	●	●	●		●				・は種時覆土前専用剤
				成苗ポット 1箱当り30g																					
		チアジソールカルボキシミド・ジアミド	アプライパディート粒剤	中苗マット 1箱当り50g	<u>は種前、 は種時覆土前</u>	1	◎	△	○		－	○	○	●	●	●	●	●	●	※1	●			・は種時覆土前専用剤 ※1：「は種時覆土前」でヒメヒウカに登録あり	
				成苗ポット 1箱当り30g																					
	—	チアジソールカルボキシミド・ネオニコチノイド・SDHI	エバーゴルフオルテラ箱粒剤	中苗マット 1箱当り50g	<u>は種前、 は種時覆土前 ～移植当日</u>	1	○	◎	○	○		○	－	－	●	●					●	●	●	●	
				成苗ポット 1箱当り30g																					
—	チアジソールカルボキシミド・ネオニコチノイド・ジアミド	ツインターボフェルテラ箱粒剤	中苗マット 1箱当り50g	<u>は種前、 は種時覆土前 ～移植当日</u>	1	◎	◎	○		△○	○	■	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
			成苗ポット 1箱当り30g																						
—	イソチアゾール・ジアミド	ブーンパディート箱粒剤	中苗マット 1箱当り50g	<u>は種前、 は種時覆土前 ～移植当日</u>	1	◎	△	◎		○	△	×	●	●	※1	●	●	※1	※1	※2	●			※1：「移植当時」での登録 ※2：「移植当日」でヒメヒウカの登録あり	
			成苗ポット 1箱当り30g																						