

4. 作物および使用方法

展 着 剤 の 種 類	展 着 剤 名	適 用 薬 剤 名 適 用 作 物	散 布 液 １００ℓ あ たり 使 用 量	特 性				
				湿 展 性	浸 透 性	分 散 性	固 着 性	懸 垂 性
（スー プ レ ッ タ ー）	ハ イ テ ン パ ワ ー	殺虫剤・殺菌剤	１０～２０ml	◎～○	○	△	—	△
	グ ラ ミ ン S	殺虫剤・殺菌剤	１０～３０ml	◎	○	○～△	○	○
	ま く び か	殺虫剤・殺菌剤	１０～３３ml	◎	○～△	○～△	—	—
（ア ジ ユ バ ン ド）	ア プ ロ ー チ BI	野菜、果樹、 花卉、稲、麦類	１００ml ５０ml	○	◎	○	○	○
	ニ ー ズ	野菜、水稻、麦等	５０～１００ml	○	◎	○	◎	—
	ス カ ッ シ ュ	野菜、いも類、甜菜、果 樹、豆類（種実）、花き	５０～１００ml	◎	◎	○	○	○
	サーファクタント３０	除草剤の登録内容の作物	１００～５００ml	◎	◎	○	○	○
	ド ラ イ バ ー	殺虫剤・殺菌剤	２０～１００m	◎～○	○	△	—	△
	ミ ッ ク ス パ ワ ー	稲、麦、キャベツ、 はくさい、きゅうり等	３３～１００ml	◎	◎	○	○	○
	レ ナ テ ン	除草剤の登録内容の作物	１００～２００ml	◎	◎	○	○	○

参考資料：２０２４クミアイ農業総覧より

注）「まくぴか」は泡立ちを避けるため、散布タンクに水を満たした後に添加する。
注）浸透性を高める展着剤（機能性展着剤等）では、混用する農薬・作物（生育ステージ）・気象条件等
によっては薬害を生じる場合がありますので注意してください。

「特性の説明」
○湿展性 : 散布した液滴が、葉など植物体の表面をぬらして広がり、接触する性質。
○浸透性 : 散布した薬液を葉などの植物体に浸透させる性質。
○分散性 : 散布液中に薬剤を均一に分散させる性質。
○固着性 : 散布した薬剤が葉などの植物体に付着したのち、はがれにくくする性質。
○懸垂性 : 散布希釈中で固形分を均一に懸垂させた状態を維持する性質。