

処理方法	毒性	予防／治療	系統名	薬 剤 名	希釈倍率	水100ℓあたり 使用薬量
土壌処理	劇	—	カーバメート	バ イ デ ー ト L 粒 剤	20～50kg/10a	
	—	—	SDHI	ビ ー ラ ム 粒 剤	10～20kg/10a	
	—	—	ネオニコチノイド*	ス タ ー ク ル 粒 剤	全面：9～12kg/10a 播溝：4～6kg/10a	
	劇	—	合ピレ	フ ォ ー ス 粒 剤	全面：6～9kg/10a 播溝：4～9kg/10a	
	—	—	有機リン	ダ イ ア ジ ノ ン 粒 剤 5	全面および作条：4～6kg/10a	
株元散布	—	—	合ピレ	ガ ー ド ベ イ ト A	3kg/10a	
散布	—	—	有機リン	サイアノックス乳剤	1,000～1,500倍	66～100ml
					1,000～2,000倍	50～100ml
	劇	—	合ピレ	ゲ ッ ト ア ウ ト WDG	3,000倍	33g
	—	—	合ピレ	ト レ ボ ン 乳 剤	1,000～2,000倍	50～100ml
		—	ネオニコチノイド*	スタークル顆粒水溶剤	1,000倍	33～100ml
	劇	—	ネオニコチノイド*	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	50g
					2,000～4,000倍	25～50g
		—	メソイオン系	フィールドマストフロアブル	4000倍	25ml
	—	—	フルキサメタド*	グ レ ー シ ア 乳 剤	2,000～3,000倍	33～50ml
	劇	—	ネライストキシン	パ ダ ン SG 水 溶 剤	1,500倍	66g
	—	—	オキサジアジン	トルネードエース DF	2,000倍	50ml
	—		IGR	ノ ー モ ル ト 乳 剤	2,000倍	50ml
	—	—	IGR	カ ス ケ ード 乳 剤	2,000～4,000倍	25～50ml
	—	—	マクロライド*	ア ファ ー ム 乳 剤	1,000～2,000倍	50～100ml
	—	—	ジアミド*	プレバソンフロアブル 5	2,000倍	50ml
		—	ジアミド*	ベ ネ ビ ア OD	2,000～4,000倍	25～50ml
	—	—	ピリタリル	プ レ オ フ ロ ア ブ ル	1,000倍	100ml
	—	—	その他	ファインセーフフロアブル	1,000～2,000倍	50～100g
			メタジアミド*	ブ ロ フ レ ア S C	2,000～4,000倍	25～50ml
	—	—	BT	ゼンターリ顆粒水和剤	1,000～2,000倍	50～100g
	—	—	スピノシン	デ ィ ア ナ SC	2500～5000倍	20～40ml
		予	銅	ク プ ロ シ ール ド	1,000～1,500倍	66～100g
	—	予治	カルボン酸	ス タ ー ナ 水 和 剤	1,000倍	100g
	—	予治	抗生	バ リ ダ シ ン 液 剤 5	500倍	200ml
	—	予	Qil	ランマンフロアブル	2,000倍	50ml
	—	予	微生物	マスタピース水和剤	1,000～2000倍	50～100g
	—	予治	抗生・銅	カ ス ミ ン ボ ル ド ー	1000倍	100g
—	予治	抗生・カルボン酸	カ セ ッ ト 水 和 剤	1000倍	100g	
—	予	銅	コ サ イ ド 3 0 0 0	1000倍	100g	
—	予治	Qoi	アミスター 20フロアブル	2,000倍	50ml	

[illegible]