

■ねぎの殺虫剤

| 区分       |                                          | 毒性 | 系統名                   | 薬 剤 名                   | 希釈倍率         | 水100Lあたり<br>使用薬量               |
|----------|------------------------------------------|----|-----------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|
| 土壌<br>処理 | アザミウマ類<br>ネギハモグリバエ<br>（育苗時）              | －  | ネオニコチノイド <sup>*</sup> | ス タ ー ク ル 粒 剤           | 6kg/10a      |                                |
| 株元<br>散布 |                                          | －  | 合ビレ                   | ガ ー ド ベ イ ト A           | 3kg/10a      |                                |
| 灌注       |                                          | －  | ネオニコチノイド <sup>*</sup> | ス タ ー ク ル 顆 粒 水 溶 剤     | 50倍          | 1箱あたり<br>500ml灌注<br>（1箱あたり10g） |
| 散<br>布   | ネギアザミウマ<br>ネギハモグリバエ<br><br>7月中旬～<br>8月中旬 | －  | ネオニコチノイド <sup>*</sup> | ス タ ー ク ル 顆 粒 水 溶 剤     | 2,000倍       | 50g                            |
|          |                                          | 劇  | 合ビレ                   | ア グ ロ ス リ ン 乳 剤         | 1,000倍       | 100ml                          |
|          |                                          |    |                       |                         | 2,000倍       | 50ml                           |
|          |                                          | －  | シアミド <sup>*</sup>     | プ レ バ ソ ン フ ロ ア ブ ル 5   | 2,000倍       | 50ml                           |
|          |                                          | －  | スピノシン                 | デ ィ ア ナ S C             | 2,500～5,000倍 | 20～40ml                        |
|          |                                          | －  | その他                   | グ レ ー シ ア 乳 剤           | 2,000～3,000倍 | 33～50ml                        |
|          |                                          | 劇  | METI                  | ハ チ ハ チ 乳 剤             | 1,000倍       | 100ml                          |
|          |                                          | －  | その他                   | ブ ロ フ レ ア SC            | 2,000～4,000倍 | 25～50g                         |
|          |                                          | －  | シアミド <sup>*</sup>     | ベ ネ ビ ア OD              | 2,000倍       | 50ml                           |
|          |                                          | －  | マクロライド <sup>*</sup>   | ア フ ァ ー ム 乳 剤           | 1,000倍       | 100ml                          |
|          |                                          |    |                       |                         | 1,000～2,000倍 | 50～100ml                       |
|          |                                          | －  | IGR                   | カ ス ケ ー ド 乳 剤           | 4,000倍       | 25ml                           |
|          |                                          | －  | その他                   | プ レ オ フ ロ ア ブ ル         | 1,000倍       | 100ml                          |
|          |                                          | －  | 有機リン                  | ト ク チ オ ン 乳 剤           | 1,000倍       | 100ml                          |
|          |                                          | －  | 有機リン                  | ス ミ チ オ ン 乳 剤           | 700～1,000倍   | 100～142ml                      |
|          |                                          |    |                       |                         | 1,000～2,000倍 | 50～100ml                       |
|          |                                          | －  | その他                   | ウ ラ ラ D F               | 1,000～2,000倍 | 50～100g                        |
|          |                                          | －  | ネオニコチノイド <sup>*</sup> | ダ ン ト ツ 水 溶 剤           | 2,000～4,000倍 | 25～50g                         |
|          |                                          | －  | アミノナゾリン               | コ ル ト 顆 粒 水 和 剤         | 2,000倍       | 50g                            |
|          |                                          | －  | その他                   | フ ァ イ ン セ ー ブ フ ロ ア ブ ル | 1,000～2,000倍 | 50～100g                        |
|          |                                          | 劇  | マクロライド <sup>*</sup>   | ア グ リ メ ッ ク             | 500～1,000倍   | 100～200ml                      |

| 使用時期<br>(収穫前日数) | 回数<br>以内 | 適用病害虫名    |        |       |          |      |         |      |        |        | 防除上の注意事項                                                 |
|-----------------|----------|-----------|--------|-------|----------|------|---------|------|--------|--------|----------------------------------------------------------|
|                 |          | シロイチモジヨトウ | ネキリムシ類 | ネギコガ  | ネギハモグリバエ | タネバエ | ネギアザミウマ | ハダニ類 | アザミウマ類 | アブラムシ類 |                                                          |
| 定植時             | 1        |           |        |       | ●        |      |         |      | ●      |        | ・株元散布                                                    |
| 生育初期            | 3        |           | ●      |       |          |      |         |      |        |        |                                                          |
| 定植前日<br>～定植時    | 1        | ●         |        | ●     | ●        | ●    |         |      | ●      |        | ・灌水 セル成型育苗トレイ<br>(30×60cm・使用土壌約1.5～4㎏)                   |
| 3日前             | 2        |           |        |       |          |      |         |      | ●      |        |                                                          |
| 7日前             | 5        | ●         |        |       |          |      |         |      |        |        |                                                          |
|                 |          |           |        | ●     | ●        |      |         |      | ●      | ●      |                                                          |
| 3日前             | 3        | ●         |        | ●     |          |      |         |      |        |        | ・ハモグリバエ類で登録あり。<br>・無人航空機による散布の登録あり。<br>(20倍、1-2L/10a)    |
| 前日              | 2        | ●         |        | ●     | ●        |      |         |      | ●      |        |                                                          |
| 7日前             | 2        | ●         |        | ●     | ●        |      |         |      | ●      |        | ・クロバネキコバエ類にも登録あり。<br>・他作物でハダニ類に登録がある。                    |
| 7日前             | 2        | ●         |        | ●     | ●        |      |         |      | ●      | ●      | ・浸透移行性がないので、かけ残しのないように 散布する。<br>・べと病、さび病にも登録あり。          |
| 前日              | 3        | ●         |        | ●     | ●        |      |         |      |        |        | ・SC製剤なので高温時でも葉焼けが出にくい。                                   |
| 前日              | 3        | ●         |        | ●     | ●        |      |         |      | ●      |        | ・銅剤(フェスティバルC水和剤等)との混用不可。                                 |
| 7日前             | 3        |           |        |       | ●        |      |         |      |        |        | ・他作物でハダニ類に登録がある。                                         |
|                 |          | ●         |        |       |          |      |         |      |        |        |                                                          |
| 14日前            | 3        | ●         |        |       | ●        |      | ●       |      |        |        | ・クロバネキコバエ類にも登録あり。                                        |
| 3日前             | 4        | ●         |        |       |          |      | ●       |      |        |        |                                                          |
| 7日前             | 3        | ●         |        | ●     | ●        |      |         |      | ●      |        | ネダニ(2,000倍、3L/㎡)で登録あり。                                   |
| 21日前            | 2        |           |        | 1,000 |          |      |         |      | ●      |        |                                                          |
|                 |          |           |        | ●     |          |      |         |      |        | ●      |                                                          |
| 前日              | 3        |           |        |       |          |      | ●       |      |        |        |                                                          |
| 3日前             | 4        |           |        |       | ●        |      | ●       |      |        |        |                                                          |
| 3日前             | 3        |           |        |       | ●        |      | ●       |      |        | ●      | ・16倍(1.6L/10a)、20倍(2L/10a)、32倍(3.2L/10a)で無人航空機による散布登録あり。 |
| 3日前             | 2        |           |        |       | 2,000    |      |         |      | ●      |        |                                                          |
| 3日前             | 3        |           |        |       | ●        |      |         |      | ●      |        |                                                          |