

■水 稲 防除体系例(一般栽培)

項 目	4月			5月			6月	
	上	中	下	上	中	下	上	中
生育ステージ		は種期			移植期			
各病害虫の防除時期	ばか苗病	●						
	褐条病	●						
	苗立枯細菌病	●						
	苗立枯病			○				
	イネドロオウムシ	(箱施用) ○			(箱施用) ○	(箱施用) ○		—○—
	イネミズゾウムシ	(箱施用) ○			(箱施用) ○	(箱施用) ○		—○—
	フタオビコヤガ							
	いもち病	(箱施用) ○			(箱施用) ○			(水面施用) ○
	カメムシ							
	※1							
薬剤の使用例①	温湯消毒		タチガレエースM液剤 500倍 500ml/箱マツト		ブーンバズSC 500倍 500ml/箱マツト			
薬剤の使用例②	温湯消毒	中苗 成苗 ブーンバディート箱粒剤 50g 箱マツト	アプラインバディート箱粒剤 30g 箱マツト	タチガレエースM液剤 500倍 500ml/箱マツト				
薬剤の使用例③	タフブロック +温湯消毒		タチガレエースM 500倍 500ml/箱マツト	バディート箱粒剤 50g /箱マツト				

	7月			8月			9月			
	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
生育ステージ		幼穂形成期		止葉期		出穂期				収穫期
各病害虫の防除時期										
※1										
薬剤の使用例①	ダントツ粉剤DL 3kg/10a				ダブルカットトレボン 3kg/10a	ブラシキクラブ 粉剤DL 3kg/10a	ビームスタークル 粉剤5DL 3kg/10a			
薬剤の使用例②	ダントツEXフロアブル 1250倍 25L/10a				ダブルカットトレボン フロアブル 300倍 25L/10a	ブラシキクラブ フロアブル 300倍 25L/10a	ビームエイトスタークル ゾル 300倍 25L/10a			
薬剤の使用例③	オリブライト250G 250g/10a				ダブルカットトレボンFL ビビフルフロアブル 1000倍 100L/10a	ブラシキクラブ フロアブル 1000倍 100L/10a	ビームエイトスタークル ゾル 1000倍 100L/10a			

備考

- 1 前年いもち病の発生した圃場では、必ず防除を実施する(6月25日~30日の散布が望ましい)。
- 2 カスガマイシンを含む農薬の使用回数は「2回まで」なので防除の組み合わせに注意する。(例)ダブルカット
- 3 フサライドを含む農薬の総使用回数は「3回まで」なので防除の組み合わせに注意する。(例)ブラシキ
- 4 フェリムズンを含む農薬の総使用回数は「2回まで」なので防除の組み合わせに注意する。(例)ブラシキ

※1: ●は基幹防除、○は臨機防除