■水稲の殺菌剤・殺虫剤 （育苗期）

区分	毒性	予防／治療	系統名	薬剤名	希釈倍率	使用薬量	使用時期（収穫前日数）	回数以内	適用病害虫名 ばか苗病	細菌もみ枯病	細菌苗立枯病	褐条病	フザリウム苗立枯病	ピシウム苗立枯病	リゾープス苗立枯病	トリコデルマ苗立枯病	いもち病	ウンカ類	グイネヒメハエモリバ	ゾウムシ	オイネムシロドム	コガヤタオビフ	防除上の注意事項
種籾消毒	－	予	微生物	タフブロック	200倍 24時間種子浸漬	10L当り50g	催芽時	－	●	●	●	●	●		●	●	※						･温湯消毒と併用すること ※種子感染による苗いもちの対策剤であり、本田でのいもち病対策は別途必要
					200倍 24～48時間種子浸漬		催芽前		●	●	●		●		●	●	※						
床土土壌混和	－	予	有機塩素	ダコニール粉剤	育苗箱1箱当り15～20g		は種前	1							●								･タチガレン液剤との併用はさけ、タチガレン粉剤を使用する。また、併用によって生育抑制の薬害が助長されるケースがあるので注意する
	－	予 治	ﾃﾄﾗｿﾞﾘﾙｵｷｼﾑ	ナエファイン粉剤	1箱（土約5L）当り6～8g		は種前	1					●	●	●								
	－	予	ｲｿｷｻｿﾞｰﾙ	タチガレン粉剤	1箱当り3～6g		は種前	1					●	●									･できる限り、は種作業間近に使用する。 ･他剤と併用する場合は一剤を土壌に均一に　混和したのち、もう一剤を均一に混和する
	－	予 治	ｲｿｷｻｿﾞｰﾙ・ﾌｪﾆﾙｱﾏｲﾄﾞ	タチガレエースＭ粉剤	1箱（土約5L）当り6～8g		は種前	1					●	●									･できる限り、は種作業間近に使用する。 ･他剤と混用する場合は一剤を土壌に均一に　混和したのち、もう一剤を均一に混和する
土壌灌注	－	予 治	ﾃﾄﾗｿﾞﾘﾙｵｷｼﾑ	ナエファインフロアブル	1,000倍	1箱当り希釈液500ml （1箱当り0.5ml）を 土壌灌注	は種時	2					●	※ ●	●								※ピシウム菌については、は種時から緑化期（但し、移植15日前まで）1000～2000倍で　登録有り
					2,000倍	1箱当り希釈液1L （1箱当り0.5ml）を 土壌灌注								●									
	－	予 治	ｲｿｷｻｿﾞｰﾙ・ﾌｪﾆﾙｱﾏｲﾄﾞ	タチガレエースＭ液剤	500倍	1箱当り希釈液500ml （1箱当り1ml）を 土壌灌注	は種時 または 発芽後	1					●	●									
	－	予	ｲｿｷｻｿﾞｰﾙ	タチガレン液剤	500倍	1箱当り希釈液500ml （1箱当り1ml）を 土壌灌注	は種時 および 発芽後	2					●	●									
	－	予	有機塩素	ダコニール１０００	500倍	1箱当り希釈液500ml （1箱当り1ml）を 土壌灌注	は種時から 緑化期 但し, は種14日後まで	2							●								･ダコニール1000を用いる時はタチガレエース液剤との同時使用は避け、3～5日の間隔を空ける
灌注処理	－	－	ﾈｵﾆｺﾁﾉｲﾄﾞ	ダントツ水溶剤	200倍	中苗マット 1箱当り希釈液500ml （1箱当り2.5g）を灌注 成苗ポット 1箱当り希釈液300ml （1箱当り1.5g）を灌注	移植3日前 ～移植当日	1										●		●	●	●	･育苗箱の上から均一に潅注する
	劇	－	ﾈｵﾆｺﾁﾉｲﾄﾞ	アドマイヤー顆粒水和剤	500倍	中苗マット 1箱当り希釈液500ml （1箱当り1.0g）を灌注 成苗ポット 1箱当り希釈液300ml （1箱当り0.6g）を灌注	移植2日前 ～移植当日	1										●		●	●		
	－	－	ｼﾞｱﾐﾄﾞ	バズ顆粒水和剤	1,000倍	中苗マット 1箱当り希釈液500ml （1箱当り0.5g）を灌注 成苗ポット 1箱当り希釈液300ml （1箱当り0.3g）を灌注	は種時(覆土前) ～移植当日	1												●	●	●	
	－	－	ｼﾞｱﾐﾄﾞ	ヨーバルキングフロアブル	400倍	中苗マット 1箱当り希釈液500ml （1箱当り1.25ml）を灌注 成苗ポット 1箱当り希釈液300ml （1箱当り0.75g）を灌注	は種時(覆土前) ～移植当日	1												●	●	●	
	－	予	ﾁｱｼﾞｱｿﾞｰﾙｶﾙﾎﾞｷｻﾐﾄﾞ	ルーチンフロアブル	75～100倍	中苗マット 1箱当り希釈液500ml （1箱当り5ml）を灌注 成苗ポット 1箱当り希釈液300ml （1箱当り3ml）を灌注	移植3日前 ～移植当日	1		75倍 ●							●						
	－	予	ｲｿﾁｱｿﾞｰﾙ・ｼﾞｱﾐﾄﾞ	ブーンバズSC	500倍	中苗マット 1箱当り希釈液500ml （1箱当り1ml）を灌注 成苗ポット 1箱当り希釈液300ml （1箱当り0.6ml）を灌注	移植7日前 ～移植当日	1									●			●	●		