■たまねぎの殺虫剤・殺菌剤

区分		毒性	予防／治療	系統名	薬剤名	希釈倍率	水100ℓあたり使用薬量	使用時期（収穫前日数）	回数以内	適用病害虫名 乾腐病	黒斑病	べと病	黄斑病	小菌核病	（白斑葉枯病 灰色かび病）	灰色腐敗病	軟腐病	白色疫病	タマネギバエ	ネギアザミウマ	アザミウマ類	アブラムシ類	防除上の注意事項
苗浸漬	乾腐病	－	予治	ﾍﾞﾝｽﾞｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ	ベンレート水和剤	20倍	（苗根部浸漬）	移植直前	1	●													・移植直前に苗根部浸漬3分間
土壌混和	タマネギバエ	－	－	有機ﾘﾝ	ダイアジノン粒剤5	3～5kg/10a		は種時 定植時	2										●				・作付前:全面土壌混和または作条土壌混和 ・作物生育中:作条処理して軽く覆土
茎葉散布	ネギアザミウマ 発生初期	－	－	有機ﾘﾝ	オルトラン水和剤	1,000～1,500倍	66～100g	21日前	5											●			・16倍で無人航空機による散布登録あり。 ネギハモグリバエ登録あり。
		劇	－	合ﾋﾟﾚ	ゲットアウトWDG	2,000～3,000倍	33～50g	7日前	5												●		
		－	－	有機ﾘﾝ	スミチオン乳剤	1,000～2,000倍 700～1,000倍	50～100ml 100～142ml	21日前	2												● ●	●	
		－	－	ｽﾋﾟﾉｼﾝ	ディアナSC	2,500～5,000倍	20～40ml	前日	2												●		・ﾈｷﾞﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ、ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ、ｼﾛｲﾓｼﾞﾖﾄｳにも登録あり。
		－	－	その他	ファインセーブフロアブル	1,000～2,000倍	50～100g	3日前	3												●		
		－	－	有機ﾘﾝ	トクチオン乳剤	1,000倍	100ml	7日前	4												●		・300倍、25L/10aで登録あり。
	白斑葉枯病 8月中旬以降 灰色腐敗病 6月中旬以降	－	予	ｼﾞｶﾙﾎﾞｷｼｲﾐﾄﾞ	ロブラール水和剤	1,000倍	100g	7日前	3		●				●	●							
		－	予	有機塩素	ダコニールエース	750～1,500倍	66～133ml	7日前	6			750 ●	750 ●		● ●	750 ●							灰色かび病に8倍(1.6L/10a)、16倍(3.2L/10a)で無人航空機による散布登録あり。
		－	予治	有機硫黄 ﾄﾘｱｿﾞｰﾙ	どさんこスター水和剤	500倍	100g	3日前	3			●		●	●								・石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用は避けること。
		－	予治	有機硫黄 ﾄﾘｱｿﾞｰﾙ	グットクル水和剤	500倍	100g	3日前	3			●		●	●	●							
		－	予	その他	フロンサイドSC	1,000～2,000倍	50～100g	3日前	5			●			●	●		1000 ●					
		－	予治	CAA・有機塩素	プロポーズ顆粒水和剤	1,000倍	100g	7日前	3			●			●			●					
		－	予	銅	クプロシールド	1,000～1,500倍 1,000～2,000倍	66～100ml 50～100ml	－	－			● ●					●						・りん片腐敗病に1,000倍で登録あり。 ・斑点細菌病に1,000~2,000倍で登録あり。
		－	予治	CAA・銅	フェスティバルC水和剤	600～800倍	125～166g	7日前	3			●						●					
		－	予治	DMI	シルバキュアフロアブル	2,000倍	50ml	前日	3					●	●	●							
		－	予治	DMI	リベロ水和剤	2,000倍	50g	前日	3					●	●	●							
		－	予治	ｼﾞｶﾙﾎﾞｷｼｲﾐﾄﾞ	スミレックス水和剤	1,000倍	100g	前日	5					●	●	●							・灰色かび病に16倍、2.4L/10aで無人航空機による散布登録あり。
		－	予治	SDHI	アフェットフロアブル	2,000倍	50ml	前日	4					●	●	●							
		－	予治	SDHI	オルフィンフロアブル	2,000倍～3,000倍	33～50g	前日	3					●	●	●							
		－	予	ｸﾞｱﾆｼﾞﾝ	ベルクート水和剤	1,000倍	100g	前日	5					●	●	●							
		－	予治	QoI	ファンタジスタ顆粒水和剤	2,000～3,000倍 2,000～4,000倍	33～50g 25～50g	前日	5					 ●	 ●	● 							
		－	予治	DMI	デビュー乳剤	800倍	125ml	前日	3					●	●								
		－	予治	ﾍﾞﾝｽﾞｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ	トップジンM水和剤	500～1,000倍	100～200g	前日	6					●		●							・定植後は5回以内の使用とする。
	軟腐病 7月上旬～ 8月下旬	－	予治	ｶﾙﾎﾞﾝ酸	スターナ水和剤	1,000倍	100g	7日前	5								●						
		－	予治	抗生・銅	カスミンボルドー	1,000倍	100g	14日前	5								●						
		－	予	微生物	マスタピース水和剤	1,000～2,000倍	50～100g	前日	－								●						・微生物農薬なので使用条件に注意する。 特に乳剤の殺虫剤とは混用しない。
		－	予治	抗生・銅	バクテサイド水和剤	500～1,000倍	100～200g	7日前	5								●						・高温時の薬害に注意する。