

■水稻の殺菌剤・殺虫殺菌剤（本田粉剤・粒剤防除）

区分		毒性	予防／治療	系統名	薬 剤 名	希釈倍率	10aあたり使用量	使用時期 (収穫前日数)	回数以内	適用病害虫名									防除上の注意事項
										いもち病	紋枯病	カメムシ類	ウンカ類	オイネムシ	ゾイネムシ	ハイモグリハエメ	ニカメイチュウ	コフヤオガビ	
いもち病・カメムシ混合剤	穂揃期まで	－	予防	抗生物質・MBI-R・ビレスロイト [®]	ダブルカットトレボン粉剤DL	－	3～4kg	穂揃期まで	2	●		●	●						・穂揃期とは、圃場全体で見て、有効分げつの90%以上が出穂した日である ・カスガマイシンの総使用回数が2回以内であるため、これを含むダブルカット混合剤やカスミン剤は、あわせて2回以内までしか使用できないので注意する ・小麦など周辺作物への飛散に注意すること
	穂揃期以降	－	予防	MBI-R・ネオニコチノイド [®]	ビームスタークル粉剤5DL	－	3～4kg	7日前まで	3	●		●	●						
		－	予防	ピリミジン・MBI-R・ビレスロイト [®]	ブラシントレボン粉剤DL	－	3～4kg	7日前まで	2	●		4kg●	●						・フェリムゾン総使用回数が2回以内であるため、これを含むブラシン剤は合わせて2回以内までしか使用できないので注意する
いもち病	発生時 (臨機対応)	－	予防	ピリミジン・MBI-R	ブ ラ シ ン 粉 剤 D L	－	3～4kg	7日前まで	2	●									・小麦など周辺作物への飛散に注意すること
カメムシ		－	－	ネオニコチノイド [®]	ダ ン ト ツ 粉 剤 D L	－	3～4kg	7日前まで	3			3～4kg●	3～4kg●	3kg●				3kg●	
		－	－	ビレスロイト [®]	ト レ ボ ン 粉 剤 D L	－	3～4kg	7日前まで	3			●	●	●	● (成虫)	3kg●	●	3kg●	
		－	－	ネオニコチノイド [®]	ス タ ー ク ル L 粉 剤 D L	－	3～4kg	7日前まで	3			●	3kg●						
		－	－	ネオニコチノイド [®]	ス タ ー ク ル 粉 剤 D L	－	3kg	7日前まで	3			●	●	●			●	●	
		－	－	ネオニコチノイド [®]	ス タ ー ク ル 豆 つ ぶ	－	250～500g	7日前まで	3			250g●	●						
		－	－	ネオニコチノイド [®]	ス タ ー ク ル 豆 つ ぶ	－	250～500g	7日前まで	3			250g●	●						
(水いも 面もち 施用病)	6/下旬～	－	予防	オキシミジアセトアミド [®]	オ リ ブ ラ イ ト 250G	－	250g	出穂10日前まで 但し 収穫45日前まで	1	●	●								・葉いもち防除の使用適期は初発の10日前～10日後 穂いもちにも効果あり