

■大豆・小豆の病害虫防除体系例

時期		5月	6月			8月			9月	
		下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬
大豆	生育 ステージ	播種時		は種1月後		開 花 始	開 花 始 10～15日後	開 花 始 20～25日後		
	殺菌剤	クルーザー MAXX 乾燥種子1kg あたり8ml		フェスティバルC 水和剤 600倍		プロポーズ 顆粒水和剤 1,000倍	スミレックス 水和剤 1,000倍	トップジンM 水和剤 700倍 または ファンタジスタ 顆粒水和剤 2,000倍	プライア 水和剤 1,000倍	
		茎疫病 苗立枯病 紫斑病		茎疫病 斑点細菌病		べと病	菌核病		紫斑病 菌核病 灰色かび病	
	殺虫剤	クルーザー MAXX 乾燥種子1kg あたり8ml	ゲットアウト WDG 3,000倍	オルトラン 水和剤 1,000倍	ゲットアウト WDG 3,000倍		ゲットアウトWDG 3,000倍	プレバソン フロアブル5 4,000倍	トクチオン 乳剤 1,000倍	バイスロイド 乳剤 2,000倍
		アブラムシ類 タネバエ	ジャガイモヒゲ ナガアブラムシ	アブラムシ マメシクイガ	ジャガイモヒゲ ナガアブラムシ		マメシクイガ			
小 豆	生育 ステージ	播種時		は種1月後		開 花 始	開 花 始 7～10日後	開 花 始 14～20日後		
	殺菌剤	クルーザー MAXX 乾燥種子1kg あたり8ml		フェスティバルC 水和剤 600倍		スミレックス 水和剤 1,000倍	ファンタジスタ 顆粒水和剤 2,000倍	プライア 水和剤 1,000倍		
		茎疫病		茎疫病 褐斑細菌病		菌核病 灰色かび病	炭そ病 菌核病 灰色かび病	紫斑病 菌核病 灰色かび病		
	殺虫剤	クルーザー MAXX 乾燥種子1kg あたり8ml		エルサン 乳剤 1,000倍		トクチオン 乳剤 1,000倍	プレバソン フロアブル5 4,000倍	ゲットアウト WDG 3,000倍	エルサン 乳剤 1,000倍	
		アブラムシ類 タネバエ		アブラムシ類		アズキノメイガ				